

Link do produktu: <https://herbalekadonis.pl/formeds-bicaps-quercetin-p-3776.html>

FORMEDS BICAPS QUERCETIN +

Cena	36,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	0012094
Kod EAN	5903148621050

Opis produktu

BICAPS® QUERCETIN+

Ilość porcji: 30

BICAPS QUERCETIN+ to połączenie kwercetyny z perełkowca japońskiego i pokrzywy zwyczajnej z witaminami C, D oraz wysoko przyswajalnym wapniem (cytrynian).

Witaminy C i D wspierają m.in. funkcjonowanie układu odpornościowego. Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia.

5 składników

- witamina C (kwas L-askorbinowy),
- naturalna witamina D (z lanoliny),
- wysoko przyswajalny wapń (cytrynian wapnia),
- ekstrakt z perełkowca japońskiego,
- ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej

skład produktu

Zalecana porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera (referencyjna wartość spożycia %):

Witamina C – 240 mg (300%),
Witamina D (D3) – 50 µg (1000%) / 2 000 IU,
Wapń (cytrynian wapnia) – 120 mg (15%),
Ekstrakt z perełkowca japońskiego – 126 mg, w tym kwercetyna – 123,5 mg;
Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej – 200 mg, w tym 8 mg polifenoli.

IU - International Unit (1 µg = 40 IU)

Składniki: wapń (cytrynian wapnia), pullulan (otoczka kapsułki), witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (*Urtica Dioica* L.), ekstrakt z perełkowca japońskiego (*Styphnolobium japonicum* L.), witamina D3 (cholekalcyferol z lanoliny).

Sposób użycia:

Spożywać 2 kapsułki 1 raz dziennie w trakcie posiłku, który zawiera tłuszcz.

Masa netto: 32,5 g

Ilość kapsułek / porcji: 60/30.

Warunki przechowywania:

Chronić przed światłem, przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Środki ostrożności

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przed zastosowaniem produktu wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz skonsultowanie wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.