

Link do produktu: <https://herbalekadonis.pl/urofort-plyn-100g-p-1777.html>

UROFORT PŁYN 100G

Cena	19,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	0008777
Kod EAN	5909990699315

Opis produktu

Urofort - to zdrowy układ moczowy !

Urofort to wieloskładnikowy lek ziołowy, który szybko i skutecznie przyniesie Ci ulgę w stanach zapalnych układu moczowego.

Działając antybakteryjnie i moczopędnie oczyszcza Twoje drogi moczowe i wyleczy infekcje.

Urofort jest lekiem naturalnym pozyskiwanym ze świeżych ziół.

Płynna postać leku gwarantuje szybkie wchłanianie i lepszą skuteczność.

Wskazania do stosowania:

- leczenie łagodnych i nawracających zakażeń dolnych dróg moczowych (pieczenie podczas oddawania moczu lub częste oddawanie moczu u kobiet)
- lek zwiększający ilość moczu
- poprawiający przepływ w drogach moczowych w łagodnych dolegliwościach układu moczowego.

Skład:

- [wyciąg z liścia mącznicy](#)
- [wyciąg z ziela nawłoci](#)
- [wyciąg z ziela pokrzywy](#)

Dawkowanie:

Dorośli:

8 ml produktu leczniczego 2 razy dziennie.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat:

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.

Sposób podawania:

Płyn przeznaczony do podania doustnego.

Należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą.

Lek należy przyjmować po posiłku.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

UROFORT

Płyn doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby można było ją przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 4 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Urofort i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed rozpoczęciem stosowania leku Urofort
3. Jak stosować lek Urofort
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Urofort
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Urofort i w jakim celu się go stosuje

Wskazania do stosowania

Urofort jest stosowany tradycyjnie w leczeniu łagodnych i nasilających zaburzeń dróg moczowych, objawiających się pieczeniem podczas oddawania moczu lub częstym oddawaniem moczu u kobiet, kiedy poważne schorzenia zostały wykluczone przez lekarza. Lek zapobiegający ból moczui poprawiający przepływ w drogach moczowych w łagodnych dolegliwościach układu moczowego.

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urofort

Kiedy nie stosować leku Urofort

- jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie na którykolwiek składnik produktu leczniczego lub rośliny z rodziny astrowatych/roślinnych (Asteraceae/Compositae)
- jeśli u pacjenta występują stany chorobowe, w których zalecana jest przegryzanie niesteroidów przeciwzapalnych

- Jeśli u pacjenta występują objawy spowodowane ograniczeniem czynności serca i nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Stosowanie produktu leczniczego u młodszych wymaga wcześniejszej konsultacji lekarskiej
- Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego występują objawy takie jak gorączka, trudności w oddawaniu moczu, skurczom, lub brzo w maczu, należy skonsultować się z lekarzem
- Urofort zawiera wyłog z fólz męczyłoz, przez co może powodować zaburzenia moczau na kółor złokłokawo-brunatny
- Ten produkt leczniczy zawiera 40-100% (10%) etanolu (alkoholu). Pojedyncza dawka leku (8 ml) zawiera do 3,15 g etanolu, co odpowiada 80 ml płinu lub 11 ml wina. Preparat może działać uspokajanie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz dzieci, a także osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby czy padaczką. Dość alkoholu w tym produkcie leczniczym może wpłynąć na działanie innych leków. Dość alkoholu w tym produkcie leczniczym może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn
- Jednocześnie przyjmowanie z tylnofizycznym dławetkami (lekami moczopędnymi) nie jest zabazane

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat

Nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.

Lek Urofort a inne leki

Dotychczas nie obserwowano interakcji.

Ciepła i karmienie piersią

W okresie ciąży lub karmienia piersią nie należy się przyjmowanie produktu leczniczego.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie badano. Dość alkoholu w tym produkcie leczniczym może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Po przyjęciu leku pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak stosować lek Urofort

Doradzi

8 ml produktu leczniczego 2 razy dziennie.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat

Nie należy się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.

Sposób podawania

Płyn przeznaczony do podania doustnego.

Należy odmierzyć odpowiednią dawkę poprzez przesłanie leku z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem owocowym i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą. Lek należy przyjmować po posiłku.

Czas stosowania

Leku Urtofort nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego objawy utrzymują się dłużej niż 4 dni lub się nasilają, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Urtofort

Nie badano. Możliwe następki osłabienie zdolności psychofizycznych oraz nudności i wymioty.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Urtofort

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Długożacz nie służy do leczenia. Może wywołać nudności, wymioty, ból brzucha, reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie podejrzanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndp@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dostęp zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na portalu bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Urtofort

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Dopuszczalne jest krótkie zmniejszenie powstałe w czasie przechowywania. Lek nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Urtofort:

1 ml płynu doustnego Urtofort zawiera 1 ml wykiado płynowego doustnego (1:1) z Arctostaphylos uva-ursi L. (ścisłe mącznicy) / Solidago virginica L. (ścisłe nasłonecznika) / Urtica dioica L. (ścisłe pokrzywy) (H2/X202). Rozpuszczalnik etanolowy etanol 50% (V/V). Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 40-50% (V/V).

Jak wygląda lek Urtofort i co zawiera opakowanie

Opakowanie produktu leczniczego Urtofort stanowi butelka ze szkła baranego, z nakrętką z polipropylenu oraz załączoną miarką z polipropylenu, umieszczoną w kartoniku. Opakowanie zawiera 100 g produktu leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Lek Natury" Tadeusz Polakowski

ul. Zielona 30

05-500 Ryki

Tel: 81 865 10 69

Data opracowania ulotki:

2016.04.06